

## 辨發汗後病脈證并治第十七

發汗多 亡陽讖語者 不可下 與柴胡桂枝湯 和其榮衛 以通津液 後自愈 方  
二十五  
柴胡四兩 桂枝一兩半去皮 黃芩一兩半 芍藥一兩半 生薑一兩半 大棗六枚擘 人參一兩半 半  
夏二合半洗 甘草一兩炙  
右九味 以水六升煮取三升 去滓 溫服一升 日三服

脈經<sup>七ノ十一</sup>オ同、

醫心引醫門方云、凡發汗多則亡陽、誠語者不可下、一ノ十一ウ

〔成〕胃為水穀之海津液之主、發汗多亡津液、胃中燥必發讖語、此非實熱則不可下、與柴胡桂枝湯、和其榮衛行津液、津液生則胃潤讖語自止、

〔印〕陽氣者精則養神、汗多亡陽則神昏而讖語矣、然陽生於陰、此雖亡其標、不可再傷其本、而致陰陽之離脫也、夫津液藏於陰府、柴胡湯能啓發陰中之陽、桂枝湯調和榮衛、津液通而氣血調、則陰陽和而後自愈矣、

〔錫〕可發汗篇云、汗多亡陽、故發汗多則亡陽、亡陽而復讖語、則陽氣亡于外、而神氣復虛于內矣、故不可下、與柴胡桂枝湯和其榮衛而通津液、讖語後必自愈、此以見雖亡陽讖語、而實由榮衛不和津液不通之所致、故只宜和其榮衛通津液、而讖語自愈矣、

〔程〕此讖語作鄭聲看、

案發汗多亡陽訖語者、誤認為胃實訖語、則恐庸工或有用下藥之誤、故云不可下而戒之也、是餘邪不在表不在裏、只在少陽部位心胸水飲之中、其熱波及于心竅、故為訖語、桂枝湯和其榮衛、柴胡湯以湧津液、則後日訖語自愈也、今世每見發汗過多後發訖語不屬胃實者、多在肝火上亢水飲內畜人、用柴桂湯則水飲自散、餘邪自解、訖語亦自愈矣、宜詳脈舌而勿誤治也、陽明篇云、陽明病脇下鞭滿、不大便而嘔、舌上白胎者、可與小柴胡湯、上焦得通、津液得下、胃氣因和、身濇然汗出而解、四九可以徵矣、

案ずるに「發汗多、亡陽、訖語者」誤認して胃實の訖語と為せば、則ち庸工或いは下藥を用いる誤有るを恐れる、故に「不可下」と云つて之を戒める也、是餘邪が表に在らず裏に在らず、只少陽部位心胸水飲の中に在り、其熱が心竅<sup>舌</sup>〔漢方用語大辭典〕に波及、故に訖語を為す、桂枝湯其榮衛を和し、柴胡湯以て津液を湧<sup>わ</sup>かせば、則ち「後日訖語自愈也」、今世每<sup>つね</sup>に發汗過多後訖語を發し胃實に屬さざる者を見る、多く肝火上亢<sup>擧</sup>水飲內畜の人在り、柴桂湯を用いれば則ち水飲自散、餘邪自解、訖語亦自愈矣、宜しく脈舌を詳<sup>つまびらかに</sup>にして誤治する勿<sup>な</sup>かれ也、陽明篇云「陽明病、脇下鞭滿、不大便而嘔、舌上白胎者、可與小柴胡湯、上焦得通、津液得下、胃氣因和、身濇然<sup>輕度發汗・森田幸門「傷寒論入門」</sup>汗出而解」四九以て徵とすべし矣、

辨發汗後篇完 2007/08/7