

辨可下病脈證并治第二十一 合四十四法 方一十一首

一 大法 秋宜下

玉函五ノ廿ニオ **脈經**七ノ十七オ **醫心**引醫門方一ノ十ウ翼方十ノ十三オ同、

〔成〕秋時陽氣下行則邪亦在下、故宜下、

〔印〕自上而降從外而収、秋之氣也、肅殺而甚、燥氣流行、金之令也、降者順之燥者逆之、治之道也、不日春夏宜吐而日春宜吐、不日秋冬宜下而日秋宜下、蓋春氣自下而升、秋氣自上而降、寓義于人之邪氣自外而內者宜下、自下而上者宜吐、

〔錫〕陽明居中土而為萬物之所歸、又為燥金、以屬秋、秋為収邪實於中、土正氣収斂而不能外出者、宣下之、此順天時之大法也、日晡而陽明旺、乃一日之秋也、

二 凡可下者 用湯勝丸散 中病便止 不必盡劑也

玉函經、凡服下藥、用湯勝圓、中病即止、不必盡劑、五ノ廿ニオ

脈經云、凡可下者、以湯勝圓散、中病便止、不必盡三服、七ノ十七オ

「醫門方」凡服湯下中病便止不可盡劑、醫心一ノ十ウ

千金翼、凡宜下、以湯勝丸散、

又云、凡服湯下、中病則止、不必盡參服、十ノ十三オ

〔成〕湯之為言蕩也、滌蕩腸胃、漑灌藏府、推陳燥結却熱下寒、破散邪疫、理導潤澤枯槁、悅人皮膚益人血氣水能淨萬物故勝丸散、中病即止者如承氣湯證云若一服利則比後服、又曰、若一服讖語止更莫復服、是不盡劑也、

〔印〕湯劑蕩滌、丸緩留中、是以下藥用湯勝丸、攻利之劑中病即止、過服則反傷正氣矣、

〔錫〕湯者盪也、丸者緩也、下欲其速故湯勝丸、下傷中氣故中病即止、不必盡劑也、

〔程〕用湯勝丸、貴活法也、中病即止、示節制也、

醫心方蔣孝琬云、須知春秋服散、夏服湯、冬服丸、便是依時之藥方、言夏服湯者夏人氣行皮膚禁衛之中、若人夏受得邪初病者淺不深、故服湯去初邪耳、冬服丸者冬寒人氣深入行於五藏六府骨髓之內、若初受邪者病還深入與人氣併行若服湯、湯氣散、未至病所、氣已盡矣、故作丸服之、散遲日服之不廢用者、不費而病愈、故冬服丸、春秋服散者、春秋二時、晝夜均、寒暑調、人氣行於皮完之間、不深不淺、故用散、和酒服之、酒能將藥氣、行入人完中、以去其邪、故春服散、

三 下利 三部脈皆平 按之心下鞅者 急下之 宜大承氣湯 五 用前第二方

玉函經、下利三部脈皆平、一云浮按其心下堅者、可下之、宜承氣湯、五ノ廿ニウ

脈經云、下利三部脈皆平、按其心下堅者、可下之、屬承氣湯證、七ノ十七ウ

千金翼、下利三部脈皆浮、按其心下堅者宜下之、十ノ十三ウ

王本浮下有一作平注文十ノ二九ウ

〔成〕下利者脈當微厥、今反和者、此為內實也、下利三部脈平者已為實、而久按之心下鞅、

故則邪甚也、故宜大承氣湯下之、

〔印〕下利脈平、脈證不相應矣、不相應則脈自脈、而證自證、病自病而平自平矣、夫脈者中焦水穀之變見、三部脈平、中焦自和也、下利、下焦自利也、心下鞭、上焦自結也、夫陰陽和者病自愈、今三焦不和、上下離結、若不急下則、水自下泄、火自上炎、陰陽相離、害莫大矣、」此章當重在急字上看、若謂穀實於中無別證而脈又、平等是緩證矣、

〔錫〕本經云若自下利者脈當微厥、今反和者此篇內實也、下利三部脈皆平別脈自和也、脈和而按之心下鞭者、邪氣內實而正氣不傷也、當急下之以瀉其邪、緩則邪盛而正衰、變證百出矣、故宜大承氣湯、愚常見當下不下之證變證百出遂成不治之病、此先師所以教人急下也、高士宗曰、經云衛之悍氣別走陽明、其性慄悍滑疾、傷人最速、下利者悍氣下逆而利也、悍氣為病、行于脈外、不入經俞、故三部脈皆平、按之心下鞭者、神機不利也、夫脈外之邪慄悍罔制、心下之氣、窒礙難通、急下其邪而神機自轉、緩則譬如卒中不可為期矣、此說亦精、宜備參之、

〔方〕三部脈皆平血氣和可知矣、心下鞭實也、所以急也、

案下利三部脈皆平は、是邪氣與水飲下流以下利病愈者、蓋其胃氣壯實水飲太多之人有如此者、平者辨脈篇所云寸口關上尺中三處大小浮沈遲數同等雖有寒熱不解者此脈陰陽為和平雖劇當愈^{十八}是也、心下鞭者、邪氣與飲結于此也、急宜下之、則餘邪從餘飲一齊瀉出也、心下鞭者胃實之所波及、下之而愈之證、說見陽明篇^{廿六}中、吳又可熱結旁流大腸膠閉用承氣、其說已濫觴于此、凡下利證用下藥、與自汗用汗藥同理、乃通因通用之法耳、

案ずるに「下利、三部脈皆平」は、是邪氣が水飲と下流、下利を以て病愈ゆる者、蓋し其胃氣壯實水飲太多^{甚だ多い}の人に此の如き者有り、「平」は辨脈篇所云「寸口、關上、尺中三處、大小浮沈遲數同等、雖有寒熱不解者、此脈陰陽為和平、雖劇當愈、」^{十八}是也、「心下鞭者」邪氣が飲と此に結ぶ也、急ぎ宜しく之を下せば、則ち餘邪が餘飲に従い一齊瀉出する也、「心下鞭者」胃實の波及する所、之を下して愈ゆるの證、説は陽明篇^{廿六}中を見よ、吳又可熱結旁流大腸膠^{かたい}閉用承氣、其説已^すでに此に濫觴^{ランショウ・物事のはじめ}、凡そ下利證に下藥を用いる、自汗に汗藥を用いると同理、乃ち通因通用*の法耳、

*通因通用 素問至真要大論七十四「帝曰、反治何謂、岐伯曰、熱因寒用、寒因熱用、塞因塞用、**通因通用**、」通じすぎるようにみえる病症を現しているときでも、とどこおったものがあるために、通じすぎていることもありますから、そのときは反治を行って、さらに通じてやると自然にとまるものです。小曾戸丈夫「意積黄帝内經運氣」

四 下利脈遲而滑者內實也 利未欲止 當下之 宜大承氣湯 六 用前第二方

玉函經^{五ノ廿ニウ}無大字、

千金翼、下利脈遲而滑者實也、利未欲止宜下之、^{十ノ十三ウ}

玉本實上有内字、^{十ノ十九ウ}

〔成〕經曰、經脈遲者、食乾物得之、金匱要略曰、滑則穀氣實、下利脈遲而滑者、皆有宿食也、脾胃傷食、不消水穀、是致下利者、為內實、若但以温中厚腸之藥、利必未止、可與

大承氣湯下去宿食、利自止矣、

〔印〕下利虚證也、滑者実脈也、脈遲而滑、蓋有所留阻而致經氣不輸、此為内実、故利未欲止、下之則愈、通因通用也、滑為經氣実、因邪実而脈遲、

〔程〕遲而滑、滑在下而遲在上、知為物阻之遲、非寒陰之遲、故但下其所阻、則内実去、而遲得進、利自止矣、

〔錫〕此承上文而言也、言下利三部脈皆平、固當急下、若下利脈遲而滑、遲則正為邪碍而不及、滑則邪実于内而有餘、故為内実也、腸胃内実、故利未欲止、當下之以瀉其実、

案遲者經邪閉塞之脈也、如陽明脈遲^{十六廿九}也、滑者胃氣流利之脈也、如陽明少陽合病脈滑而数者有宿食也、當下之宜大承氣湯、七四大下後不大便有宿食者宜大承氣湯、明五九並與此條同理、

案ずるに「遲」は經邪閉塞の脈也、陽明脈遲^{十六廿九}の如き也、「滑」は胃氣流利の脈也、「陽明少陽合病・・脈滑而数者、有宿食也、當下之、宜大承氣湯、」七四 「大下後・・不大便・・有宿食者、宜大承氣湯、」明五九の如き並^{みな}此の條と同理、

<p>五 問曰 人病有宿食 何以別之 師曰 寸口脈浮而大 按之反瀼 尺中亦微而瀼 故知有宿食 當下之 宜大承氣湯 八 用前第二方 金匱宿食第十文同</p>

玉函經、問曰、人病有宿食、何以別之、師曰、寸口脈浮大、按之反澁、尺中亦微而澁、故知有宿食、當下之、宜承氣湯、五ノ廿三オ

千金翼、問曰、人病有宿食何以別之、答曰、寸口脈浮大、按之反澁^澁尺中亦微而澁、故知有宿食、宜下之、十ノ十三ウ

王本作尺中亦微而急、一作瀼 十ノ廿オ

〔成〕寸以候外、尺以候内、浮以候表、沈以候裏、寸口脈浮大者、氣質血虚也、按之反澁尺中亦微而澁者、胃有宿食、裏氣不和也、與大承氣湯以下宿食、

〔方〕此承上文復設問答、言脈以申明之之意、

〔印〕蓋陰陽之氣皆由中而發、槃飪之邪留積於中、中氣阻滯、以致表裏陰陽之氣、皆虚微矣、見是脈者為有宿食也、當下之則愈、宜大承氣湯、夫脈遲而滑者經氣実也、右宿食者、中有阻瀼而致陰陽之氣虚微也、脈各不同、故復設問答以分別焉、

案胃中有宿食則胃氣之升降不常、故令寸浮尺澁、可下之、宿食瀉出則胃氣循環、脈狀復平也、

案ずるに胃中に宿食有れば則ち胃氣の升降常ならず、故に寸浮尺澁せしむ、之を下すべし、宿食瀉出すれば則ち胃氣循環、脈狀平に復^かえる也、

<p>六 下利不欲食者 以有宿食故也 當下之 宜大承氣湯 九 用前第二方</p>

玉函經、下利不欲食者、有宿食也、當下之、宜承氣湯、五ノ廿三オ

千金翼、下利不欲食者、有宿食、宜下之、十ノ十三ウ

〔成〕傷食則惡食、故不欲食、如傷風惡風傷寒惡寒之類也、

〔方〕不欲猶惡也、宿陳久也、猶世俗所謂積也、

〔印〕上章論宿食之脈、此復審其證焉、止下利而不欲食、是無別因之邪矣、夫腸胃受盛水穀、傳化物而不藏、故實而不能滿、下利則腸胃空虛、而反不欲食者、有宿食故也、當下之則愈、

〔程〕傷食惡食、故不欲食與不能食者自別、下利有此更無別樣虛證、知非三陰之下利、而宿食之下利也、

〔錫〕飲食入口則胃實而腸虛、食下則腸實而胃虛、大腸為傳道之官、夫大腸不為傳道、則宿食停滯于中、胃與腸俱實、故不欲食、所以然者以有宿食在腸胃故也、當以大承氣下之以去其宿食、

七 下利差 至其年月日時復發者 以病不盡故也 當下之 宜大承氣湯 十 用前第二方

玉函經、下利已瘥、至其年月日時復發者、此為病不盡故也、復當下之、宜承氣湯、五ノ廿三ウ

千金翼、下利差、至其時復發、此為病不盡、宜復下之、十ノ十三ウ

王本無之字十ノ廿オ

〔成〕乘春則肝先受之、乘夏則心先受之、乘至陰則脾先受之、乘秋則肺先受之、假令春時受病氣必傷肝、治難愈、邪有不盡者、至春時元受月日、內外相感邪、必復動而病也、下利為腸胃疾、宿積不盡、故當下去之、

〔方〕其期也、謂周其一年之月日期也、

〔印〕下利復發者、病邪未盡也、經言三百六十五日成一歲、人亦應之、人有四經以應四時、十二月應四時、十二月應十二脈、歲有三百六十五日、計人亦有三百六十五節、蓋人與天地參也、至其年月日者、歲氣一周而復會也、復發者此因時所感之邪、病未盡而伏匿於內、復因時之氣而後發也、留連之邪、下之則愈、

〔程〕下利差後而徐邪棲於腸胃迴折處者未盡、是為伏邪、凡得其候而伏者、仍應其候而伸、下則搜而盡之矣、

八 病腹中滿痛者 此為實也 當下之 宜大承氣大柴胡湯 十一 用前第一第二方

玉函經、病腹中滿痛者為實、當下之、宜大柴胡湯、五ノ廿三ウ

千金翼、凡病腹中滿痛者、為寒、宜下之、十ノ十三ウ

王本作凡病腹中滿痛者為實、宜下之、實一作寒、十ノ二十オ

〔成〕金匱要略曰、病者腹滿按之不痛為虛、痛為實、可下之、腹中滿痛者裏氣壅實也、故可下之

〔印〕陽明篇曰、腹痛者急下之、蓋燥實鞭堅、有形之邪實也、止滿而痛者、無形之邪實也、無形之崇甚於有形、

〔錫〕外無他病、而惟病腹中滿痛者、脚氣內實也、當以大承氣下之、此憑證以知之也、

案腹中満痛者、水飲邪氣結聚在胃腸中也、説詳見於陽明篇七二中、

案ずるに「腹中満痛者」水飲邪氣が胃腸中に結こりかたまる聚あつまる也、説詳は陽明篇七二中を見よ、

九 下利脈反滑 當有所去 下乃愈 宜大承氣湯 十二 用前第二方

玉函經、下利脈反滑、當有所去、下之乃愈、宜承氣湯、五ノ廿三ウ 案文玉函此條與前條倒置、成本同、案文訓詁玉函此の條前條と倒置此の条が先に記されている、成本同、

〔成〕脈經曰、脈滑者為宿食也、下利脈滑則内有宿食、故云當有所去、與大承氣湯以下宿食、

〔印〕滑者往来流利如珠、有諸内而形諸外也、下利脈反滑者、當有所去也、下之乃愈、前章内実故兼脈遲、此則欲去故止見滑、是以胎脈痰脈皆滑、

〔錫〕下利脈當微、今脈反滑者、内有宿物、當有所去、下之則宿物去、而利自愈、此憑脈以知之也、

十 傷寒後脈沈 沈者内実也 下之解 宜大柴胡湯 十四 用前第一方

玉函經、傷寒後脈沈実、沈実者下之解、宜大柴胡湯、五ノ廿三ウ

〔成〕傷寒後篇表已解、脈沈為裏未和、與大柴胡湯以下内実、經曰、傷寒差以後更發熱脈沈実者、以下解之、

〔印〕傷寒寸脈浮関脈沈、邪結於胸也、傷寒後脈但沈、而無胸脇之形證者、邪実於内也、夫胸脇内連乎膈、氣分之邪皆從胸膈而入、在膈而上瀉心梔子證也、在膈而下大小承氣證也、在膈之間大柴胡也、此内実於有形之間、故宜大柴胡湯下之則愈、

十一 脈雙弦而遲者 必心下鞅 脈大而緊者 陽中有陰也 可下之 宜大承氣湯 十七 用前第二方

玉函經、脈雙弦而遲、心下堅、脈大而緊者、陽中有陰也、可下之、宜承氣湯、五ノ廿四オ

千金翼、脈雙弦而遲、心下堅、脈大而緊者、陽中有陰、宜下之、十ノ十三ウ

〔龐〕脈雙弦而遲、心下堅、或脈而緊者、陽中有陰、可下之、二ノ十四ウ

〔成〕金匱要略曰、脈雙弦者寒也、經曰、為遲為在藏脈雙弦而遲者、陰中伏陽也、必心下鞅、大則為陽、緊則為寒脈大而緊者、陽中伏陰也、與大承氣湯、以分陰陽、

〔印〕此承上文而言在膈之邪留連於上下之間也、夫藏府之氣皆從胸膈以出入、而諸脈皆貫於膈、邪在膈間、故脈雙弦而遲也、邪在膈故心下鞅也、邪実于膈故脈但沈、遊行于上下則經氣有所阻、故脈弦遲也、膈之上乃心肺之分為陽、膈之下乃肝腎之分為陰、感心肺之氣則脈大、感肝腎之陰則脈緊、此邪在於中膈上下之間、故脈大而緊者、陽中有陰也、可下之、蓋經氣上下相通、下之則在上之邪亦從下而解矣、故曰可以下之、

〔錫〕夫曰可者、或可而未皆可之辭也、此當神而明之、觸類而旁通之、則頭頭是道、無微

不微矣、仲景之言、神矣至矣、

辨可下篇完 2007/08/17